

Būtiniosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo 2 priedas

SUAUGUSIŲJŲ SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MASTAS

Skubiosios medicinos pagalbos kategorija	Laikas, per kurį turi būti pradėta teikti pagalba	Ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos
1	2	3
1 kategorija	Nedelsiant, tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai.	<ol style="list-style-type: none"> Esamas ar gresiantis širdies ir (ar) kvėpavimo sustojimas. Pacientas po gaivinimo. Kvėpavimo dažnis (toliau – KD) < 10 kartų per minutę KD >29 kartai per minutę. Sistolinis arterinis kraujų spaudimas (toliau – AKS) < 80 mmHg. Šamonės praradimas ir nereagavimas į skausmą arba reakcija pagal Glazgo komą skalę (toliau – GCS) < 9 balai. Viso kūno traukuliai. Intraveninis vaistų arba narkotikų perdozavimas, sukėlęs hipoventiliaciją ir hemodinamikos sutrikimą. Ūminis cheminis akių pažeidimas.
2 kategorija	Pacientui skubioji medicinos pagalba turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.	<ol style="list-style-type: none"> Ūmus, gyvybei grėsmingas kvėpavimo ir (ar) kraujotakos sutrikimas. Ūmus didelio kraujo kiekiečio (25 procentų cirkuliujančio kraujo kiekiečio arba daugiau) netekimas. Labai stiprus / nepakeliamas skausmas dėl jvairių priežasčių, kai skausmo intensyvumas vertinamas 9–10 balų pagal dešimties balų skalę. Hipoglikemija arba hiperglikemija, kai gresia pavojus išsivystyti hipoglikeminei komai, diabetinei ketoacidozei arba hiperosmoliarinei hiperglikemijai. Karščiavimas, kai yra klinikinių sepsio požymių (ne mažiau kaip du iš šių požymių: KD > 22 kartai per minutę, AKS < 100mmHg, bet kokio lygio šamonės sutrikimas). Bendras kūno atšalimas, kai temperatūra < 36 °C. Sunki trauma. Didelės rizikos anamnezė: <ol style="list-style-type: none"> didelio raminamųjų medžiagų kiekiečio suvartojimas ar kitos kilmės toksinių medžiagų suvartojimas; kitas gyvybei pavojingas apsinuodijimas; gyvybei pavojingas aplinkos faktorių poveikis (generalizuota alerginė reakcija). Psichikos ir elgesio sutrikimai: <ol style="list-style-type: none"> agresija arba smurtas, keliantys grėsmę pačiam pacientui ir aplinkiniams; intensyvus psichomotorinis sujaudinimas, kai reikalingas fizinius asmens laisvės suvaržymas dėl grėsmės sau ar aplinkiniams.

3 kategorija	Pacientui skubioji medicinos pagalba turi būti pradėta teikiti ne vėliau kaip per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.	<p>1. Hipertenzinė krizė su greitai progresuojančiais širdies-kraujagyslių ir (ar) centrinės nervų sistemos pažeidimo požymiais.</p> <p>2. Vidutinio sunkumo nukraujavimas su klinikiniais požymiais dėl bet kokios priežasties.</p> <p>3. Mieguistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GCS < 13 balų).</p> <p>4. Oksigenacija < 90 procentų.</p> <p>5. Besikartoantys traukuliai, užfiksoti per pastarąsias 12 valandų.</p> <p>6. Besikartoantis vėmimas ir (ar) viduriavimas esant sisteminei intoksikacijai.</p> <p>7. Ūmi dehidratacija.</p> <p>8. Galvos trauma ir trumpalaikis sąmonės netekimas.</p> <p>9. Stiprus skausmas, vertinamas 6–8 balais pagal dešimties balų skalę, kai reikia skubiai numalšinti skausmą.</p> <p>10. Ūmi židininė neurologinė simptomatika.</p> <p>11. Galūnės trauma, dėl kurios sutriko kraujotaka.</p> <p>12. Psichikos ir elgesio sutrikimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12.1. mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmę; 12.2. ūmios psichožes; 12.3. sunki psichologinė trauma, sukelianti elgesio sutrikimus; 12.4. sunki depresija; 12.5. ryškus psichomotorinis sujaudinimas. <p>13. Kiauryminis akies sužalojimas ar ūmus visiškas regėjimo netekimas.</p>
4 kategorija	Pacientui skubioji medicinos pagalba turi būti pradėta teikiti ne vėliau kaip per 60 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.	<p>1. Karščiavimas $> 39^{\circ}\text{C}$, nepraeinantis vartojant geriamuosius vaistus ilgiu kaip 24 valandas.</p> <p>2. Ūmus per pastarąsias 48 valandas atsiradęs širdies ritmo (supraventrikulinė tachikardija, prieširdžių virpėjimas, prieširdžių plazdėjimas, placių kompleksų tachikardija) ar laidumo (II–III laipsnio AV blokada, atrioventrikulinis ritmas) sutrikimas.</p> <p>3. Šlapimo sulaikymas, anurija, dializuojamo paciento komplikacijos: A/V šunto tromboze, dializinio kateterio iškritimas / trombozė / disfunkcija.</p> <p>4. Sunki abstinencijos būklė, galinti komplikuotis dėl rizikos veiksnių (anamnezėje būta psichožių, traukulių; gali komplikuotis dėl gretutinių ūmių ir létinių ligų; kompulsyvus psichoaktyviųjų medžiagų potraukis).</p> <p>5. Pasiutusių ar galimai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai, apseilėjimai.</p> <p>6. Kitos traumos (nenurodytos 2 ir 3 kategorijose) ir nelaimingi atsitikimai, įvykę per pastarąsias 48 valandas, esant didėjančiam tynimui, stiprėjančiam funkcijos sutrikimui.</p> <p>7. Erkių įsisiurbimas.</p> <p>8. Veido ir žandikaulių srities pūliavimas.</p> <p>9. Dirbtinai suformuotų stomų sutrikimai (kai reikia jas pakeisti ar atkimšti).</p> <p>10. Negausus kraujavimas iš makšties arba pilvo skausmas nėštumo metu.</p> <p>11. Komplikacijos po medicininės intervencijos (iširusi siūlė, pūlingos išskyros, didėjantis tynimas, nepakankama imobilizacija), atsiradusios iki 48 val. po procedūros arba išrašymo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.</p> <p>12. Svetimkūniai audiniuose arba natūraliose kūno angose / kūno ertmėse, atsiradę per pastarąsias 48 valandas.</p>