

Nedelsdami kreipkitės į artimiausią skubiosios medicinos pagalbos skyrių, jeigu:



- temperatūra pakyla iki 38 °C ar daugiau, atsiranda šaltkrėtis arba ryškiai pablogėja savijauta;



- negalite pasišlapinti;



- kraujuojate gausiai, kraujavimas nesiliauja ar šlapime atsiranda daug krešulių;



- jaučiate stiprų arba stiprėjantį skausmą.

Jei kraujavimas nemažėja, atsiranda deginimas šlapinantis ar kyla kitų klausimų, susisieki su gydančiu gydytoju.

Atvykę pagalbos būtinai pasakykite, kad jums atlikta prostatos biopsija, ir nurodykite procedūros datą.

Procedūros data ir laikas:

Gydytojo paskirti vaistai ir pasiruošimo nurodymai:

Gydytojas urologas, jo kontaktai:

VšĮ Kėdainių ligoninė

Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai

Tel. 0 347 67 101

Registratūros tel.: 0 347 67090, 0 347 54447

Priėmimo-skubiosios pagalbos

skyriaus tel. 0 347 67080

El.p. administracija@kedligonine.lt

Darbo laikas: I-V 07.00-17.00



Viešoji įstaiga
Kėdainių ligoninė




Kėdainių
rajo savivaldybė



**KĄ SVARBU ŽINOTI APIE
PROSTATOS BIOPSIJĄ?**

Atmintinė pacientui



KAS YRA PROSTATOS BIOPSIJA IR KADA JI SKIRIAMA?

Prostata, arba priešinė liauka, yra po šlapimo pūsle esantis vyro lytinės sistemos organas.

Prostatos biopsija – tyrimas, kurio metu paimami nedideli prostatos audinio mėginiai. Jie tiriami mikroskopu, siekiant nustatyti, ar audinyje yra vėžinių ląstelių ar kitų pakitimų.

Biopsiją gydytojas urologas gali rekomenduoti įvertinęs PSA tyrimo rezultatus, prostatos apčiuopą, magnetinio rezonanso ar kitų tyrimų duomenis.

Kas yra PSA tyrimas?



PSA – prostatos specifinis antigenas, prostatoje gaminamas baltymas. Jo kiekis nustatomas iš venos paimtame kraujo mėginyje.

Padidėjęs PSA kiekis savaime nereiškia prostatos vėžio. Jis gali padidėti ir dėl gerybinio prostatos išvešėjimo, uždegimo, šlapimo susilaikymo ar neseniai atliktų procedūrų. Rezultatą gali paveikti ir nesena ejakuliacija.

Kai kurie vaistai, pavyzdžiui, finasteridas ar dutasteridas, mažina PSA kiekį. Apie jų vartojimą būtina pasakykite gydytojui.

KAIP PASIRUOŠTI IR KAIP ATLIEKAMAS TYRIMAS?


Prieš biopsiją informuokite gydytoją:

- apie visus vartojamus vaistus, ypač veikiančius kraujo krešėjimą;
- apie alergijas vaistams;
- jei karščiuojate, jaučiate šaltkrėtį, skausmą ar deginimą šlapinantis;
- jei anksčiau po procedūrų pasireiškė infekcija ar gausus kraujavimas.

Vaistų vartojimas

Kraujo krešėjimą veikiančių vaistų savavališkai nenutraukite. Ar reikia keisti jų vartojimą, nuspręs gydytojas.

Jei paskirti antibiotikai, vartokite juos tiksliai nurodytu laiku ir dozėmis.



Kiti pasiruošimo nurodymai

Žarnyną valykite tik tada, jei taip nurodė gydytojas. Ar prieš procedūrą galima valgyti ir gerti, priklauso nuo numatyto nuskausminimo – laikykitės jums pateiktų nurodymų.

Kaip atliekama biopsija?

Prostatos audinio mėginiai gali būti imami per tarpvietės odą arba per tiesiąją žarną. Procedūros būdą ir nuskausminimą aptarsite su gydytoju.

Naudojant ultragarsą, o prireikus ir magnetinio rezonanso tyrimo vaizdus, plona adata paimami audinio mėginiai. Jų skaičius parenkamas individualiai.

Mėginiai perduodami gydytojui patologui. Kada ir kaip sužinosite tyrimo atsakymą, informuos gydantis gydytojas.

KĄ SVARBU ŽINOTI PO BIOPSIJOS?

Po procedūros gali būti nestiprus maudimas, nedidelis kraujo kiekis šlapime ar spermoje. Jei biopsija atlikta per tiesiąją žarną, kraujo gali pasirodyti ir tuštinantis.

Kraujo priemaišos spermoje gali išlikti kelias savaites. Nedidelis kraujavimas turėtų palaipsniui mažėti.

Laikykitės gydytojo nurodymų dėl fizinio aktyvumo, lytinių santykių ir vaistų vartojimo. Gerkite pakankamai skysčių, jei dėl kitų ligų jų kiekis jums nėra ribojamas.